

10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า


- 1** เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งชื่อว่า "เรบีสไวรัส" (Rabies virus)
- 2** สามารถเกิดกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด
- 3** พบได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และทุกฤดู ไม่ใช่เฉพาะหน้าร้อน



- 4** การติดต่อเกิดจากการถูกสัตว์ที่ติดเชื้อกัด ข่วน หรือเลียโดนบาดแผล / เยื่อเมือก เช่น เยื่อเมือก จมูก ปาก
- 5** ระยะฟักตัวในคนเฉลี่ย 3 สัปดาห์ - 4 เดือน บางรายอาจนานเกิน 1 ปี ขึ้นกับจำนวนเชื้อที่เข้าไป ตำแหน่งที่โดนกัด และสายพันธุ์ของเชื้อ



- 6** ส่วนใหญ่สุนัข แมว วัว ควาย มีระยะฟักตัวไม่เกิน 6 เดือน
- 7** อาการในคน คือ มีไข้ เจ็บคอ กลืนอาหารลำบาก เป็นอัมพาต และตายในที่สุด
- 8** อาการในสุนัขที่ติดเชื้อ มี 2 แบบ คือ แบบเซื่องซึม และแบบดุร้าย



- 9** ลูกสุนัขอายุ 1-2 เดือนก็เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้
- 10** ผู้ป่วยเมื่อแสดงอาการแล้ว เสียชีวิตทุกราย ไม่มียารักษา แต่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน



រឿង 10 យ៉ាងដែលត្រូវដឹង អំពីជំងឺឆ្កែឆ្កាត

- 1** បណ្តាលមកពីវីរុសមួយប្រភេទ ឈ្មោះថាវីរុស (Rabies virus)
- 2** អាចកើតឡើងជាមួយថនិកសត្វគ្រប់ប្រភេទ
- 3** រកឃើញនៅគ្រប់ខេត្តទូទាំងប្រទេស ហើយគ្រប់រដូវមិនក្រើមតែរដូវក្តៅទេ



- 4** ការឆ្លងដែលបណ្តាលមកពីសត្វខាំ កោសឬលិតដោយមុខរបួស/ភ្លាស ដូចជា ភ្លាសភ្នែក ច្រមុះ មាត់
- 5** ដំណាក់កាលភ្លាស់ក្នុងខ្លួនមនុស្ស ជាមធ្យមគឺ 3 សប្តាហ៍-4 ខែ អាចពី 7-14 ថ្ងៃ អាស្រ័យលើចំនួននៃការឆ្លង ឬកន្លែងដែលខាំ



- 6** ភាគច្រើនឆ្កែ គោ ក្របី មានរយៈពេលឆ្លងមិនលើសពី 6 ខែ
- 7** រោគសញ្ញានៅក្នុងមនុស្ស គឺក្តៅខ្លួន ឈឺបំពង់ក ពិបាកលេបអាហារ ពិការដៃជើង ហើយទីបំផុតត្រូវបានស្លាប់
- 8** រោគសញ្ញានៅក្នុងឆ្កែដែលឆ្លង មាន 2 ប្រភេទ ដូចជា ស្ងៀមស្ងាត់ និងកាចសាហាវ



- 9** កូនឆ្កែដែលមានអាយុ 1-2 ខែ ក៏អាចក្លាយជាជំងឺឆ្កែឆ្កាតបាន
- 10** អ្នកជំងឺពេលមានរោគសញ្ញាហើយ ត្រូវបានស្លាប់គ្រប់រូប មិនមានថ្នាំព្យាបាល ប៉ុន្តែអាចការពារបានដោយការចាក់វ៉ាក់សាំង



၁၀ ခွေးရူးပြန်ရောဂါနှင့် ပတ်သက်သော ဗဟုသုတများ

1 ဗိုင်းရပ်ပိုးတစ်မျိုးမှ ဖြစ်ပွားသည် အမည်မှာ ရာဘီး(စ်)ဗိုင်းရပ်ပိုး (Rabies virus)



2 နို့တိုက်သတ္တဝါအားလုံးတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။



3 နိုင်ငံတဝန်းရှိ မြို့နယ်များတွင် တွေ့ရှိရပြီး နွေရာသီသာမက ရာသီဥတုတိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားတတ်ပါသည်။



4 ရောဂါပိုးရှိသောတိရစ္ဆာန် အကိုက်ခံရခြင်းမှ ကူးစက်ခြင်း ကုတ်ခြစ်ခံရခြင်း သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာ/အတွင်းမျက်နှာပြင် ဥပမာ မျက်လုံးအတွင်းမျက်နှာပြင်၊ နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်ကို လျှာဖြင့်အလျက်ခံရခြင်း



5 လူတွင် ဝင်ရောက်သည့် ပိုးအရေအတွက်၊ အကိုက်ခံရသည့်နေရာနှင့် ပိုးမျိုးရိုး ပေါ်မူတည်၍ ပျမ်းမျှ ၃ ပတ်မှ ၄ လအထိ ကိန်းအောင်းနေထိုင်နိုင်ပါသည်။



6 တိရစ္ဆာန်များတွင် ကိန်းအောင်းသည့်အချိန်ကာလ ပျမ်းမျှ အများဆုံး ၆ လ



7 လူများတွင်လက္ခဏာသည် ဖျားခြင်း ဖြစ်သည် လည်ပင်းနာခြင်း အစာမျိုရခက်ခဲခြင်း သွက်ချာပါဒ်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် သေဆုံးသည်



8 ခွေးတွင် ရောဂါလက္ခဏာ ၂ မျိုး ပြသပါသည်။ တမျိုးမှာ ငြိမ်သက်နေခြင်းနှင့် နောက်တမျိုးမှာ ဆိုးသွမ်းသည့်ပုံစံပြနေခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။



9 အသက် ၁-၂ လ ခွေးကလေး ခွေးရူးပြန်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်သည်



10 လူတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့ပါက အာရုံကြောလက္ခဏာများ ပြသပြီး နောက်ဆုံးတွင် သေဆုံးပါမည်။ ကုသဆေး မရှိပါ။ သို့သော် ခွေးကိုက်ခံရပါက ကြိုတင်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းအားဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။

